
Untermarkt 7-11 82515 Wolfratshausen Telefon 08171/78010 Telefax 08171/27297

Email: info@innere-gastro.de Web: www.innere-gastro.de



Gemeinschaftspraxis Dr. Ulrich Klüppelberg

Facharzt für Innere Medizin



Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie



82319 Starnberg-Percha Telefon 08151/9799060 Telefax 08171/27297 Email: info@innere-gastro.de

Enzianstraße 4a

Web: www.innere-gastro.de

Intensiv mit Mediolax, Citrafleet und Plenvu

Termin nach 10 Uhr Vorbereitung zur Koloskopie

Ihr Termin zur telefonischen Aufklärung ist am	nachmittags. Bei dieser Gelegenheit erhalten Sie Ihren
Untersuchungstermin, für diesen Sie folgend	de Abführmaßnahmen durchführen sollten:

Ein sauberer Darm ist für die Koloskopie eine Grundvoraussetzung! Bitte halten Sie die folgenden Empfehlungen möglichst genau ein! Vermeiden Sie vier Tage vor der Untersuchung Vollkornprodukte (Müsli) sowie kernhaltiges, faseriges Obst und Gemüse (z.B. Weintrauben, Kiwi, Spargel). Eine Reizung der Schließmuskelregion durch die Abführmaßnahmen können Sie durch vorheriges Eincremen mit einem Hautpflegemittel verhindern (z.B. Penatencreme).

Ab dem 4. Tag vor der Untersuchung

Jeweils 1 Tablette Mediolax nachmittags, wenn Sie zu Hause sein können. einnehmen. Diese wirken bereits abführend.

Am Tag vor der Untersuchung

Bis 11 Uhr: Frühstück

10 Uhr: Nehmen Sie eine Tablette Mediolax.

12-13 Uhr: Sie können noch eine klare Brühe ohne Einlage essen.

16 Uhr: 1 Glas Citrafleet

17-18 Uhr: Füllen Sie den Plenvu Beutel Dosis 1 in ein Gefäß und geben 0,5 Liter Wasser dazu (ca. 5 Minuten rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist) und trinken Sie diese Lösung innerhalb von 30 Minuten (bei Übelkeit oder Bauchkrämpfen pausieren bzw. langsamer trinken).

Unmittelbar danach trinken Sie innerhalb 45 Minuten langsam mindestens 0.5 l klare

Flüssigkeit ohne Kohlensäure.

Später können Sie beliebige Mengen klarer Flüssigkeiten trinken.

Am Tag der Untersuchung

6:00 Uhr: Füllen Sie die Beutel Plenvu 2A und 2B zusammen in ein Gefäß und geben 0,5 Liter Wasser und trinken Sie diese Lösung bis ca. 6.30 Uhr. In den folgenden 45 Minuten trinken Sie langsam mindestens 0,5 l klare Flüssigkeit (stilles Wasser, Tee, klare Fruchtsäfte). Ca. 1 1/2h später sollten Sie nur noch eine klare gelbliche Flüssigkeit (wie Kamillentee) ausscheiden. Falls dies nicht der Fall sein sollte, kommen Sie bitte baldmöglichst in die Praxis.

Morgens einzunehmende Medikamente nehmen Sie erst nach der Untersuchung.

Bitte nehmen Sie 90 Minuten vor Ihrem Termin keine Flüssigkeiten mehr zu sich.

- Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie nach der Untersuchung abgeholt und nach Hause begleitet werden. Da Ihr Reaktionsvermögen herabgesetzt ist, dürfen Sie die Praxis nicht allein verlassen.
- Durch unvorhersehbare, zeitintensive Untersuchungen (z.B. Polypenabtragung), können oft die Zeiten nicht eingehalten werden. Es kann zu Verschiebungen um 45 90 Minuten kommen.
- Die Wirkung von Medikamenten, auch Kontrazeptiva ("Pille"), kann durch die Abführmaßnahmen verschlechtert oder aufgehoben werden.
- Hinweis für Diabetiker: Während des Abführens sollten Sie keine "Blutzuckermedikamente" einnehmen. Bei "Unterzucker" nehmen Sie Traubenzucker.
- Bei akuten Erkrankungen (z.B. grippaler Infekt) sollten Sie Ihren Termin verschieben. Bitte melden Sie sich in solchen Fällen frühzeitig.

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an!		
Bitte kommen Sie am	um	in unsere Praxis in □ Wolfratshausen □ Starnberg-Percha